

クビアカツヤカミキリから もも、すもも、うめ、さくらを守ろう!

■ クビアカツヤカミキリって?

もも、すもも、うめ、さくらなどの樹の内部を食い荒らし、枯らしてしまう
外来昆虫です

特定外来生物に指定されており、飼育や移動が規制されています
生きたまま持ち運ぶことは**違法**です

■ どこにいるの?

和歌山県では、令和3年1月現在、県北部地域で被害を確認しています
県外では、愛知県、埼玉県、群馬県、東京都、大阪府、徳島県、栃木県、奈良県、三重県、茨城県で被害が出ています（令和3年1月現在）

■ どうしたらいいの?

被害の拡大を防ぐために、**早期発見、駆除**が重要です

情報提供にご協力をお願いします

成虫はその場で潰して
退治してください!

フラス（幼虫の排泄物と木くず）や成虫を見つけたら**最寄りの振興局に連絡**して下さい



成虫

体長：2.5～4.0cm
産卵期：6月下旬～8月下旬
羽化期：6月上旬～8月上旬
卵から1～3年で成虫が羽化
昼間に活動する



ミンチ状のフラス

幼虫はバラ科の樹木(生木)の内部を食害し、枯死させる
樹から特徴的なミンチ状のフラスを排出
幼虫の活動時期：4～10月
幼虫の越冬時期：11～3月



株元に溜まったフラス

和歌山県

<農地> 農林水産部 農業生産局 果樹園芸課 農業環境・鳥獣害対策室
<森林> 農林水産部 森林・林業局 森林整備課
<公園等> 環境生活部 環境政策局 環境生活総務課 自然環境室

TEL：073-441-2905
TEL：073-441-2970
TEL：073-441-2779

クビアカ情報



クビアカツヤカミキリの特徴



初期のフラス（栃木県提供）



株元に溜まったミンチ状フラス



幼虫



成虫 ♂

♀



成虫の脱出孔（栃木県提供）

防除対策

■ 成虫の防除（6月～8月）

- 主に幹や枝を狙って登録のある農薬を散布
- 見つけ次第、捕殺

■ 幼虫の防除（4月～10月）

- 太めの針金等で、食入孔の中のフラスをかき出し、スプレー缶型の農薬を注入

■ 被害樹の伐採・抜根（10月～翌年4月）

- 伐採樹は破砕あるいは焼却処分
- 成虫の分散を防ぐため、成虫活動期（5月～9月）は応急処理として樹にネット被覆を行う
（フラス排出部の約50 cm上部から地面まで4 mm目合いのネットを2重に巻き付け）



被害樹へのネット被覆

フラスや成虫を見つけたら最寄りの振興局に連絡して下さい

発見場所	通報先(電話番号)			
	振興局	農地	森林	その他(学校関係除く)
和歌山市、海南市、海草郡	海草	073-441-3382	073-441-3366	073-483-8825
紀の川市、岩出市	那賀	0736-61-0025	0736-61-0015	0736-61-0022
橋本市、伊都郡	伊都	0736-33-4930	0736-33-4910	0736-42-5443
有田市、有田郡	有田	0737-64-1273	0737-64-1263	0737-64-1293
御坊市、日高郡	日高	0738-24-2930	0738-24-2912	0738-24-3617
田辺市、西牟婁郡	西牟婁	0739-26-7941	0739-26-7911	0739-26-7934
新宮市、東牟婁郡	東牟婁	0735-21-9632	0735-21-9612	0735-21-9631
東牟婁郡のうち古座川町、串本町				串本支所 保健環境課 0735-72-0525

市町村立学校は、市町村所管課へ、私立学校は県庁文化学術課へ、県立学校は県教育委員会主管課へ通報